

نام درس: ریاضی

نام دبیر: معمار

تاریخ امتحان: ۱۷ / ۳ / ۱۴۰۰

ساعت امتحان: ۱۰:۰۰ صبح

مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه

جمهوری اسلامی ایران

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران منطقه ۱۱ تهران

دیبرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد انقلاب

آزمون پایان ترم نوبت دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۹

نام و نام خانوادگی:


مقطع: نهم


نام پدر:


شماره داوطلب:

تعداد صفحه سوال: ۱۴ صفحه

ردیف	محل مهر و امضاء مدیر	نمره تجدید نظر به عدد:	نمره به حروف:	نمره به عدد:
		نام دبیر:	تاریخ و امضاء:	نام دبیر:
۱		جملات درست را با (ص) و جملات نادرست را با (غ) مشخص کنید.	(الف) هر دو مربع دلخواه متشابه اند. ( ) (ب) عددی وجود دارد که هم گویا و هم گنگ باشد. ( ) (ج) عبارت $\frac{x^2+2}{x-3}$ به ازای $x = 3$ تعریف نشده است. ( ) (د) نماد علمی عدد $372\ldots\ldots\ldots$ به صورت $3/72\times 10^4$ است. ( )	۱
۱		جهای خالی را با اعداد یا کلمات مناسب کامل کنید. الف) به نسبت دو ضلع متناظر در دو شکل متشابه، ..... می گویند. ب) بین هردو عدد گویا ..... عدد گویا وجود دارد. ج) از دوران مثلث قائم الزاویه حول یکی از اضلاع قائمه، ..... به دست می آید. د) معادله خطی که از دو نقطه $(-3, -4)$ و $(-3, 4)$ می گذرد، برابر با ..... است.	۲	
۱		گزینه صحیح را انتخاب کنید. الف) کدام عبارت مشخص کننده یک مجموعه نیست? <input type="checkbox"/> ۲) اعداد طبیعی کمتر از صفر <input type="checkbox"/> ۱) اعداد صحیح کمتر از -۲ <input type="checkbox"/> ۴) سه عدد زوج متوالی <input type="checkbox"/> ۳) بزرگترین عدد فرد دورقمی	۱	
		ب) اگر نسبت تشابه دو لوزی $\frac{2}{3}$ باشد، درصورتی که ضلع لوزی بزرگتر $15\text{cm}$ باشد، اندازه ضلع لوزی کوچکتر کدام است? ۱) $12\text{cm}$ ۲) $10\text{cm}$ ۳) $22/5\text{cm}$ ۴) $13/5\text{cm}$	۳	
		ج) درجه چندجمله ای $Z^5 - 5xy^2Z^3$ - نسبت به همه متغیرها یکساخت با : ۱) $10(2)$ ۲) $8(2)$ ۳) $11(3)$ ۴) $25(4)$	۱	
		د) حاصل عبارت $\frac{1}{\frac{1}{3-1+4-1}}$ برابر است با :		

	<input type="checkbox"/> $\frac{1}{\gamma-1}$ (۴)	<input type="checkbox"/> $\frac{\gamma}{2}$ (۳)	<input type="checkbox"/> $\frac{12}{\gamma}$ (۲)	<input type="checkbox"/> $\frac{\gamma}{12}$ (۱)	
۱/۵	<p>با توجه به دو مجموعه <math>A = \{1, 2, 4, 6\}</math> و <math>B = \{1, 2, 3, 4\}</math> عبارت زیر را با اعضايیش مشخص کنید.</p> $(A \cup B) - (A \cap B) =$				۴
۱/۵	<p>الف) مجموعه زیر را روی محور مشخص کنید.</p> $M = \{x   x \in \mathbb{R}, -3 \leq x < 2\}$ 				۵
۱/۲۵	<p>ب) با توجه به محور قسمت (الف)، مشخص کنید کدامیک از موارد درست و کدام نادرست است.</p> <p><math>-\frac{15}{2} \in M</math> <input type="checkbox"/></p> <p><math>\sqrt{3} \notin M</math> <input type="checkbox"/></p> <p>ج) بین دو عدد <math>\sqrt{5}</math> و <math>\sqrt{10}</math> دو عدد گنگ بنویسید.</p>				۶
۲/۵	<p>در شکل مقابل <math>O</math> مرکز دایره است و <math>AD</math> و <math>BC</math> بر دایره مماس هستند. نشان دهید <math>BC</math> و <math>AD</math> باهم برابرند.</p> 				۷
	<p>الف) حاصل عبارت مقابل را به صورت تواندار بنویسید.</p> $\left(\frac{2}{5}\right)^{-3} \times \left(\frac{5}{2}\right)^4 =$ <p>ب) مخرج کسر مقابل را گویا کنید.</p> $\frac{7}{2\sqrt{3}} =$ <p>ج) عبارت زیر را تا حد امکان ساده کنید.</p> $2\sqrt{27} - \sqrt{12} + \sqrt{75} =$ <p>د) عبارت زیر را بدون قدرمطلق بنویسید.</p> $\sqrt{5} +  \sqrt{5} - 3  =$				

	<p>الف) جاهای خالی را کامل کنید.</p> $(2x - \dots)^2 = \dots - \dots + 36$ <p>ب) عبارت مقابله را تجزیه کنید.</p>	
۲/۲۵	<p><math>x^2 - 8x + 12 =</math></p> <p>ج) مجموعه جواب نامعادله زیر را به دست آورید.</p> $2(x - 2) \leq -2x + 4$	۸
۲	<p>الف) خط <math>6 - 2x - 2y = 0</math> را در دستگاه مختصات مقابله رسم کنید.</p>  <p>ب) شیب و عرض از مبدأ آن را مشخص کنید.</p> <p>شیب = ..... عرض از مبدأ = .....</p> <p>ج) آیا نقطه <math>(-4, -6)</math> روی این خط قرار دارد؟ چرا؟</p>	۹
۱	<p>دستگاه معادله مقابله را به روش دلخواه حل کنید.</p> $\begin{cases} x - 3y = 7 \\ 2x - 7y = 15 \end{cases}$	۱۰
۲	<p>حاصل عبارت های زیر را به دست آورید و تا حد امکان ساده کنید.</p> <p>الف) <math>\frac{3a^2}{a+1} \div \frac{a^2 - a}{a^2 - 1} =</math></p> <p>ب) <math>\frac{3}{x-1} + \frac{2}{x+1} =</math></p>	۱۱
۱	<p> تقسیم مقابله را انجام دهید.</p> $5x^2 - 7x - 6 \quad   \quad x - 3$	۱۲

۲	<p>الف) حجم کره ای به شعاع ۶ سانتی متر را به دست آورید. (نوشتن فرمول الزامی است.)</p> <p>ب) با قسمتی از دایره به شعاع ۵ cm مخروطی به قطر قاعده ۶ cm ساخته ایم. حجم این مخروط را به دست آورید.</p>  <p>ج) از دوران نیم دایره حول شعاع، ..... به دست می آید.</p>	۱۲

جمع بارم : ۲۰ نمره

نام درس: (یافته)

نام دبیر: محمدار

تاریخ امتحان: ۱۷/۳/۱۳۹۹

ساعت امتحان: ۸:۰۰ صبح

مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران  
اداره آموزش و پرورش شهر تهران منطقه ۱۱ تهران  
دبيرستان غیر دولتی دخترانه سرای دانش واحد انقلاب



**کلید** سوالات پایان ترم نوبت دوی سال تمصیلی ۹۸-۹۹

ردیف	راهنمای تصحیح	محل مهر یا امضاء مدیر
۱	هر مورد ۲۵٪ نمره	الف) ص      ب) غ      ج) ص      د) غ
۲	هر مورد ۲۵٪ نمره	

۵) $x = -3$	ج) مخروط	ب) بی شمار	الف) نسبت تشابه	
			هر مورد ۰/۲۵ نمره	۳
د) گزینه ۲	ج) گزینه ۲	ب) گزینه ۲	الف) گزینه ۴	
$(A \cup B) - (A \cap B) = \{1, 3, 6\}$				۴
			الف) نمایش روی محور ۰/۵ نمره ب) هر مورد ۰/۲۵ نمره	
$-\frac{15}{2} \in M$ غ	$\sqrt{3} \notin M$ غ		ج) هر عدد ۰/۲۵ نمره	۵
			دو مثلث OCB و OAD به حالت (ز پ ز) همنهشت هستند (استدلال همنهشتی ۱ نمره) واز اجزای متناظر نتیجه می شود BC = AD باهم برابرند. (۰/۲۵ نمره)	۶
			الف) ۰/۵ نمره	
$(\frac{2}{5})^{-3} \times (\frac{5}{2})^4 = (\frac{5}{2})^3 \times (\frac{5}{2})^4 = (\frac{5}{2})^{11}$			ب) ۰/۵ نمره	
$\frac{7}{2\sqrt{3}} \times \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \frac{7\sqrt{3}}{6}$			ج) ۰/۷۵ نمره	۷
$2\sqrt{27} - \sqrt{12} + \sqrt{75} = 6\sqrt{3} - 2\sqrt{3} + 5\sqrt{3} = 9\sqrt{3}$			د) ۰/۷۵ نمره	
$\sqrt{5} +  \sqrt{5} - 3  = \sqrt{5} - \sqrt{5} + 3 = 3$				۸
			الف) ۰/۷۵ نمره	
$(2x - 6)^2 = 4x^2 - 24x + 36$			ب) ۰/۵ نمره	
$x^2 - 8x + 12 = (x - 6)(x - 2)$			ج) ۱ نمره	۹
$2(x - 2) \leq -2x + 4 \rightarrow 2x - 4 \leq -2x + 4 \rightarrow 4x \leq 8 \rightarrow x \leq 2$				
			الف) استاندارد خط : $y = \frac{2}{3}x - 2$ (رسم معادله خط ۱ نمره)	
			ب) شیب $= \frac{2}{3}$ عرض از مبدأ $= -2$ (هر مورد ۰/۲۵ نمره)	۱۰
			ج) بله، چون مختصات آن در معادله خط صدق میکند. (۰/۵ نمره)	
			جواب دستگاه : $\begin{pmatrix} 4 \\ -1 \end{pmatrix}$ (حل دستگاه ۱ نمره)	۱۱
			هر مورد ۱ نمره	
الف) $\frac{3a^2}{a+1} \div \frac{a^2 - a}{a^2 - 1} = \frac{3a^2}{a+1} \times \frac{(a-1)(a+1)}{a(a-1)} = 3a$				۱۲

$$\text{ب)} \frac{3}{x-1} + \frac{2}{x+1} = \frac{3x+3+2x-2}{(x-1)(x+1)} = \frac{5x+1}{(x-1)(x+1)}$$

خارج قسمت :  $5x + 1$

+ ١٨ باقيمانده :

١٢

الف) ٧٥ نمره

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi \times 5^3 = 288\pi \text{ cm}^3$$

ب) ١ نمره

١٣

$$V = \frac{1}{3}Sh = \frac{1}{3} \times 3 \times 3 \times \pi \times 4 = 12\pi \text{ cm}^3$$

ج) نیم کرہ (٢٥ نمره)

امضا:

نام و نام خانوادگی مصحح :

جمع بار ٣٥ نمره



نام درس: ریاضی  
نام دبیر: مهمنار  
تاریخ امتحان: ۱۷/۳/۱۴۰۰  
ساعت امتحان: ۸:۰۰ صبح  
مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران  
اداره آموزش و پرورش شهر تهران منطقه ۱۱ تهران  
دبيرستان غیر دولتی دخترانه سرای دانش واحد انقلاب  
**کلید** سوالات پایان ترم نوبت دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۹

ردیف	راهنمای تصحیح	محل مهر یا امضاء مدیر
۱	هر مورد ۲۵٪ نمره	(الف) ص (ب) غ (ج) س (د) غ
۲	هر مورد ۲۵٪ نمره	(الف) نسبت تشابه (ب) بی شمار (ج) مخروط (د) $x = -3$
۳	هر مورد ۲۵٪ نمره	(الف) گزینه ۴ (ب) گزینه ۲ (ج) گزینه ۲ (د) گزینه ۲
۴		$(A \cup B) - (A \cap B) = \{1, 3, 6\}$
۵	الف) نمایش روی محور ۵٪ نمره ب) هر مورد ۲۵٪ نمره	$-\frac{15}{2} \in M$ غ $\sqrt{3} \notin M$ غ ج) هر عدد ۲۵٪ نمره $\sqrt{6}, \sqrt{7}, \sqrt{8}, \dots$
۶	دو مثلث OAD و OCB به حالت (ز پ ز) همنهشت هستند (استدلال همنهشتی ۱ نمره) واز اجزای متناظر نتیجه می شود BC و AD باهم برابرند. (۲۵٪ نمره)	
۷	الف) ۵٪ نمره ب) ۵٪ نمره ج) ۷۵٪ نمره د) ۷۵٪ نمره	$(\frac{-3}{5})^{-3} \times (\frac{5}{3})^4 = (\frac{5}{3})^3 \times (\frac{5}{3})^4 = (\frac{5}{3})^{11}$ $\frac{7}{2\sqrt{3}} \times \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \frac{7\sqrt{3}}{6}$ $2\sqrt{27} - \sqrt{12} + \sqrt{75} = 6\sqrt{3} - 2\sqrt{3} + 5\sqrt{3} = 9\sqrt{3}$
۸	الف) ۷۵٪ نمره ب) ۵٪ نمره	$\sqrt{5} +  \sqrt{5} - 3  = \sqrt{5} - \sqrt{5} + 3 = 3$ $(2x - 6)^3 = 4x^3 - 24x^2 + 36$ $x^3 - 8x^2 + 12 = (x - 2)(x - 2)$

ج) ۱ نمره	
$x - 2 \leq -2x + 4 \rightarrow 2x - 4 \leq -2x + 4 \rightarrow 4x \leq 8 \rightarrow x \leq 2$ <p style="text-align: center;">الف) استاندارد خط : ۲ (رسم معادله خط ۱ نمره)</p>	
<p style="text-align: right;">ب) شیب = <math>\frac{2}{3}</math> عرض از مبدأ = <math>-2</math> (هرمورد ۲۵/۰ نمره)</p> <p style="text-align: right;">ج) بله، چون مختصات آن در معادله خط صدق میکند. (۵/۰ نمره)</p>	۹
جواب دستگاه : $\begin{pmatrix} 4 \\ -1 \end{pmatrix}$ (حل دستگاه ۱ نمره)	۱۰
هر مورد ۱ نمره	
<p>(الف) <math>\frac{3a^2}{a+1} \div \frac{a^2 - a}{a^2 - 1} = \frac{3a^2}{a+1} \times \frac{(a-1)(a+1)}{a(a-1)} = 3a</math></p>	۱۱
<p>(ب) <math>\frac{3}{x-1} + \frac{2}{x+1} = \frac{3x+3+2x-2}{(x-1)(x+1)} = \frac{5x+1}{(x-1)(x+1)}</math></p>	
<p style="text-align: right;">خارج قسمت: <math>5x + 1</math></p> <p style="text-align: right;">با قیمانده: <math>+18</math></p>	۱۲
الف) ۷۵/۰ نمره	
<p><math>V = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi \times 6^3 = 288\pi \text{ cm}^3</math></p>	۱۳
<p><math>V = \frac{1}{3}Sh = \frac{1}{3} \times 3 \times 3 \times \pi \times 4 = 12\pi \text{ cm}^3</math></p>	
ج) نیم کره (۲۵/۰ نمره)	
امضاء:	نام و نام خانوادگی مصحح :
	جمع بار ۵۰: ۴۰ نمره