

کد کنترل

268

F

268F

آزمون (نیمه‌تمرس) ورود به دوره‌های دکتری – سال ۱۴۰۱

دفترچه شماره (۱)

صبح جمعه ۱۴۰۰/۱۲/۶



جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.
امام خمینی (ره)

رشته زنگیک مولکولی (کد ۲۲۲۸)

جدول مواد امتحانی، تعداد، شماره سوال‌ها و زمان پاسخ‌گویی

مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره	تا شماره	زمان پاسخ‌گویی	مجموعه دروس تخصصی:
سیتو زنگیک – زنگیک مولکولی – مهندسی زنگیک	۱۰۰	۱	۱۵۰	۱ دقیقه	– بیوشیمی – بیوفزیک – میکروبیولوژی – زنگیک – زیست‌شناسی

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.


این آزمون نمرة منفی دارد.

* متقاضی گرامی، وارد نکردن مشخصات و امضا در کادر زیر، به منزله غایبت و حضور نداشتن در جلسه آزمون است.

اینچنانبا..... با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود را با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ‌نامه و دفترچه سوال‌ها، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سوال‌ها و یا بین پاسخ‌نامه‌ام را تأیید می‌نمایم.

امضا:

- ۱- فروکتوز ۲ و ۶- بیس فسفات فعال کننده آلوستربیک کدام آنزیم کبدی است؟
- (۱) گلوکوکیناز
 - (۲) پیرورووات کربوکسیلاز
 - (۳) فسفوفروکتوکیناز - ۱
 - (۴) فروکتوز ۱ و ۶- بیس فسفاتاز
- ۲- کدام گزینه در مورد بیماری کم‌خونی داسی‌شکل (Sickle-cell anemia) درست است؟
- (۱) ناشی از جهش گلوتامات به والین در زنجیره بتا هموگلوبین است.
 - (۲) در این بیماری خصوصیات اکسی هموگلوبین دستخوش تغییر می‌شود.
 - (۳) ناشی از اتصال زنجیره‌ای مولکول‌های هموگلوبین از طریق زنجیره‌های آلفا است.
 - (۴) در این بیماری خصوصیات اکسی هموگلوبین و داکسی هموگلوبین دستخوش تغییر می‌شود.
- در شکل زیر، منحنی‌های ۱ و ۲ به ترتیب کدام نوع مهار آنزیمی را نشان می‌دهد؟



- ۳- کدام گزینه در مورد اثر آنزیم هلیکاز بر DNA صحیح است؟
- (۱) با انرژی حاصل از هیدرولیز ATP عمل می‌کند و موجب هیپرکرومیسم (افزایش جذب) می‌شود.
 - (۲) با انرژی حاصل از هیدرولیز ATP عمل می‌کند و موجب هیپوکرومیسم (کاهش جذب) می‌شود.
 - (۳) بدون هیدرولیز ATP عمل می‌کند و موجب هیپرکرومیسم (افزایش جذب) می‌شود.
 - (۴) بدون هیدرولیز ATP عمل می‌کند و موجب هیپوکرومیسم (کاهش جذب) می‌شود.
- ۴- تفاوت کیتین و سلولز کدام است؟
- (۱) در یک پلیمر اتصال بین واحدهای قندی از نوع α و در دیگری از نوع β است.
 - (۲) واحدهای قندی تشکیل‌دهنده یکی گلوکز و دیگری N استیل گلوکز آمین است.
 - (۳) در یک پلیمر نقش ساختاری و در دیگری نقش عملکردی دارد.
 - (۴) یکی رشته‌ای و دیگری دارای انشعاب است.


- ۵- کدام گزینه یک اترلیپید است؟
- (۱) اسفنگومیلین
 - (۲) پروستاگلاندین
 - (۳) taurocholic acid
 - (۴) فاکتور فعال کننده پلاکت

- ۷ سلول زنده از دیدگاه ترمودینامیکی، یک سیستم در حالت است.
- (۱) باز - تعادلی
 - (۲) بسته - تعادلی
 - (۳) باز - غیرتعادلی
 - (۴) بسته - غیرتعادلی
- ۸ براساس کدام نظریه، تاخورده‌گی (فولدینگ) پروتئین به عنوان یک مسئله جدی در زیست‌شناسی مولکولی مطرح شده است؟
- (۱) گر (Gore)
 - (۲) لوبنثال (Levinthal)
 - (۳) آنفینزن (Anfinsen)
 - (۴) چو - فاسمن (Chou-Fasman)
- ۹ کدام مارپیچ از عناصر ساختار دوم پروتئین به دلیل حذف میانکنش‌های واندروالس از پایداری کمتری برخوردار است؟
- (۱) مارپیچ α - helix
 - (۲) مارپیچ آلفا (α - helix)
 - (۳) رشته بتا (β - strand)
 - (۴) مارپیچ پای (π - helix)
- ۱۰ به شرط داشتن انرژی برابر و با زاویه تابش یکسان، کدام پرتو رادیواکتیو دارای عمق نفوذ بیشتری در بافت زنده است؟
- (۱) آلفا
 - (۲) بتا
 - (۳) پوزیترون
 - (۴) نوترون
- ۱۱ پایداری پروتئین از طریق مطالعات و با تعیین مورد بررسی قرار می‌گیرد.
- (۱) ترمودینامیکی - ثابت سرعت
 - (۲) ترمودینامیکی - ثابت تعادل
 - (۳) سینتیکی - ثابت سرعت
 - (۴) سینتیکی - ثابت تعادل
- ۱۲ در مبحث ساختار و توالی پروتئین، کدام گزینه از پارامترهای مهم در تعریف موتیف (motif) است؟
- (۱) تکرارشوندگی در ساختار پروتئین‌های مختلف
 - (۲) قابلیت تاخورده‌گی و عملکرد مستقل
 - (۳) قابلیت تاخورده‌گی مستقل
 - (۴) قابلیت عملکرد مستقل
- ۱۳ کدام یک از گزینه‌های زیر در رابطه با ساختار کوروناویروس‌ها صحیح است؟
- (۱) ویروس‌های بدون پوشش (nonenveloped) و دارای کپسید بیست وجهی (icosahedral)
 - (۲) ویروس‌های بدون پوشش (nonenveloped) و دارای کپسید مارپیچی (helical)
 - (۳) ویروس‌های دارای پوشش (enveloped) و دارای کپسید بیست وجهی (icosahedral)
 - (۴) ویروس‌های دارای پوشش (enveloped) و دارای کپسید مارپیچی (helical)
- ۱۴ همه موارد زیر در مورد اجوانات‌ها (adjuvants) درست‌اند، به جز:
- (۱) باعث افزایش نیمه عمر آنتی‌زن می‌شوند.
 - (۲) باعث تحریک اختصاصی سیستم ایمنی می‌شوند.
 - (۳) باعث آزادسازی تدریجی آنتی‌زن از محل تزریق می‌شوند.
 - (۴) به صورت غیراختصاصی می‌توانند باعث تحریک تکثیر لنفوسيت‌ها شوند.
- ۱۵ پدیده جذب احیایی نیترات توسط کدام عامل یا عوامل زیر انجام می‌شود؟
- (۱) ردوکتازهای نیترات
 - (۲) هیدروکسیل آمین‌ستناز
 - (۳) آزوفردوکسین
 - (۴) نیتروزنازها
- ۱۶ آرکی‌ها و یوکاریوت‌ها در کدام گزینه با یکدیگر شبیه‌اند؟
- (۱) اندازه ریبوزوم
 - (۲) ساختار نازک
 - (۳) اسید آمینه شروع کننده سنتز پروتئین
 - (۴) دارا بودن استرول در غشای سلولی

- ۱۷ همه موارد زیر در مورد استافیلوکوکوس اورئوس درست‌اند، به جز:
- (۱) با تولید انتروتوکسین در ایجاد سمومیت غذایی شرکت می‌کند.
 - (۲) در ایجاد سندروم فلسفی شدن پوست با تولید سم اکسفولیاتیو شرکت می‌کند.
 - (۳) با تولید کواگولاز در عمل آنتی فاگوسیتیک سلول‌های دفاعی بدن مقابله می‌کند.
 - (۴) در آزمایشگاه با توجه به حساسیت به املاح صفرایی و تست تورم کپسولی تعیین هویت می‌شود.
- ۱۸ مطابق تست‌های بیوشیمیایی، تفاوت *E.coli* و *Shigella Salmonella* در چیست؟
- (۱) *E.coli* و *Shigella* لاکتوز مثبت هستند ولی *Shigella* لاکتوز منفی است.
 - (۲) *E.coli* و *Shigella* لاکتوز منفی هستند ولی *Shigella* لاکتوز مثبت است.
 - (۳) *E.coli* و *Shigella* لاکتوز مثبت هستند ولی *Shigella* لاکتوز منفی است.
 - (۴) *E.coli* و *Shigella* لاکتوز منفی هستند ولی *E.coli* لاکتوز مثبت است.
- ۱۹ شجره زیر انتقال یک بیماری وابسته به X بسیار نادر را نشان می‌دهد. بیماری با ارث آتوزومی نهفته، با نفوذ پذیری ۱۰۰ درصد منتقل می‌شود. همسر اول فرد II-۲ فرزندی مبتلا به دنیا می‌آورد و در هنگام زایمان می‌میرد. بیمار فرد II-۲ با خواهر ناتنی همسر اولش II-۳ ازدواج می‌کند. با توجه به باردار شدن این فرد احتمال ابتلای زاده‌ی او چقدر است؟
-
- | | |
|----------------|-----|
| $\frac{1}{2}$ | (۱) |
| $\frac{1}{4}$ | (۲) |
| $\frac{1}{4}$ | (۳) |
| $\frac{1}{16}$ | (۴) |
| $\frac{1}{32}$ | (۵) |
- ۲۰ در مگس سرکه حامل سه ژن مجاور پیوسته X, Y و Z یک آمیزش سه نقطه‌ای انجام می‌شود. فاصله بین X تا Z ۲۲.۵ واحد نقشه (map unit) و فاصله X تا Y ۲۰.۵ واحد نقشه و ضریب همبستگی (coefficient coincidence) نیز ۰.۸۸۶ است. نسبت نوترکیب‌های دوگانه در میان زاده‌های این آمیزش تقریباً چقدر است؟
- (۱) ۷.۶
 - (۲) ۷.۸
 - (۳) ۷.۱۲
 - (۴) ۷.۱۶
- ۲۱ در یک فرد هتروزیگوت برای یک ژن مفروض اگر کراسینگ‌اور بین لوکوس این ژن و سانترومر کزوموزوم رخ دهد، تفکیک آلل‌های این ژن در کدام مرحله از تقسیم میوز روی می‌دهد؟
- (۱) فقط در آنماقاز I
 - (۲) فقط در آنماقاز II
 - (۳) در آنماقاز I یا در آنماقاز II
 - (۴) آلل‌ها در اینجا اصلاً از هم تفکیک نمی‌شوند.

- ۲۲- تصویر شماتیک زیر، کدام یک از ساختارهای مولکول DNA را نشان می‌دهد؟

- Z-DNA (۱)
C-DNA (۲)
B-DNA (۳)
A-DNA (۴)



- ۲۳- کدام دو گزینه در مورد تومور ساپرسورها و انکوژن‌ها درست‌اند؟

I. پروتو انکوژن‌ها از راه جهش کسب عملکرد، در حالی که تومور ساپرسور زن‌ها با جهش از دست دادن عملکرد، به توسعه سرطان منجر می‌شوند.

II. پروتو انکوژن‌ها از دست دادن عملکرد، در حالی که زن‌های تومور ساپرسور با جهش کسب عملکرد، به توسعه سرطان منجر می‌شوند.

III. جهش در هر دو آلل پروتو انکوژن برای القای سرطان لازم است، در حالی که جهش در یکی از دو آلل تومور ساپرسورها کفایت می‌کند.

IV. جهش در یکی از دو آلل در پروتو انکوژن‌ها برای القای سرطان کفایت می‌کند، در حالی که هر دو آلل جهش یافته تومور ساپرسورها برای پیشرفت سرطان ضروری‌اند.

- II, III (۱) I, IV (۲) I, III (۳) I, II (۴)

- ۲۴- در جدول زیر انواع RNA نوکلید شده در درون سلول (ستون الف) و اعمال آن‌ها (ستون ب) البته نه به ترتیب درست مطابق با ستون الف آمده است.

الف	ب
snRNAs (A)	(i) خاموش کردن بیان زن از راه هدایت تخریب mRNAهای منتخب
siRNAs (B)	(ii) تنظیم بیان زن با سدکردن ترجمه mRNAهای منتخب
miRNAs (C)	(iii) عملکرد در انواع فرایندها شامل پیرایش pre-mRNA
snoRNAs (D)	(iv) نقش در فرآوری و تغییرات شیمیایی tRNAs

در کدام گزینه ترکیبات جور و درست از گزاره‌های دو ستون آمده است؟

- A - (iv), B - (i), C - (ii), D - (iii) (۱)
A - (iv), B - (ii), C - (i), D - (iii) (۲)
A - (iii), B - (ii), C - (i), D - (iv) (۳)
A - (iii), B - (i), C - (ii), D - (iv) (۴)

-۲۵- همه عبارات زیر درست می‌باشند، به جز:

- (۱) پروفیلین به G-ADP اکتین متصل می‌شود و باعث جایگزینی ATP با ADP می‌شود.
- (۲) تیموزین β_4 به رشته F اکتین متصل شده و مانع فروپاشی آن می‌شود.
- (۳) کوفیلین ترجیحاً به رشته‌های دارای ADP - اکتین متصل شده و باعث قطعه قطعه شدن آن‌ها می‌شود.
- (۴) پروتئین CapZ به انتهای مثبت رشته اکتین متصل شده و از پلیمرازیون آن جلوگیری می‌کند.

-۲۶- کدام گزینه در مورد عوامل مؤثر در رونویسی در یوکاریوت‌ها درست است؟

- (۱) در همه پرموتورهای کلاس ۲ قرار دارد.

(۲) TFIIB توسط TATA box شناسایی می‌شود.

(۳) CAT box و GC box جزء عناصر دور از پرموتور هستند.

(۴) در یوکاریوت‌ها terminator برای توقف RNAII پلیمراز وجود ندارد.

-۲۷- کدام یک از پرسه‌های زیر در گذر از متافاز به آنفاز در میتوز مورد وارسی سیستم کنترل چرخه سلولی می‌شود؟

(۱) اتمام همانندسازی ماده ژنتیکی

(۲) اتصال کروموزوم‌ها به میکروتوبول‌های دوکی و ایجاد کشش

(۳) شرایط محیطی مناسب برای رشد سلول در G_1

(۴) ردیف شدن کروموزوم‌ها و تشکیل صفحه متافازی

-۲۸- بر روی رشته کدکننده یک مولکول DNA ردیف نوکلئوتیدی ۳'-ACT-۳' وجود دارد. آنکه کدون و کدون

متناظر آن به ترتیب از راست به چپ در کدام گزینه نشان داده شده است؟

(۱) ۵'-AGU-3' و ۵'-UCA-3' (۲) ۵'-UGA-3' و ۵'-UCA-3' (۳)

۵'-ACU-3' و ۵'-AGU-3' (۴) ۵'-AGU-3' و ۵'-ACU-3' (۳)

-۲۹- همه موارد زیر به GTP متصل هستند، به جز:

Pex5 (۴)

SRP (۳)

Ran (۳)

Ras (۱)

۱۰۰ (۴)

۵۰ (۳)

۱۰ (۲)

۵ (۱)

-۳۰- کدام مورد باعث شدن گلیکوزن فسفریلاز می‌گردد؟

Insulin (۲)

Glucagon (۱)

Noradrenaline (۴)

Adrenaline (۳)

-۳۱- در یک ساختار کروماتیتی با ۵۰ نوکلئوزوم، چند هیستون H2B دیده می‌شود؟

۱۰۰ (۴)

۵۰ (۳)

۱۰ (۲)

۵ (۱)

-۳۲- در یک آلتريپلولئید (allotriploid) حاصل از دو گونه A و B که عدد دیپلولئید (2n) آن‌ها به ترتیب ۱۶ و ۱۴ است.

چه تعداد کروموزوم یافت می‌شود؟

۴۸ یا ۴۲ (۲)

۴۵ (۱)

۲۴ یا ۲۱ (۴)

۲۲ یا ۲۳ (۳)

-۳۳- در کدام نوع نوآرابی کروموزومی، بر انوکراسینگ اور در یک موجود هتروزیگوت، یک کروموزوم دی‌سانتریک ایجاد می‌شود؟

(۱) وارونگی پاراسانتریک


(۲) اوارونگی پری‌سانتریک

(۳) حذف

(۴) مضاعف‌شدگی

- ۳۴- کدام عبارات زیر پدیده کراسینگ اور را درست توصیف می‌کنند؟
- I. شانس کراسینگ اور بین دو زن مستقیماً با فاصله بین آن‌ها بر روی یک کروموزوم بستگی دارد.
 II. شانس کراسینگ اور با افزایش فاصله بین آن‌ها افزایش می‌یابد.
 III. شانس کراسینگ اور با کاهش فاصله بین آن‌ها افزایش می‌یابد.
 IV. کراسینگ اور ترکیب صفات والدی را در میان زاده‌ها تغییر می‌دهد.
 V. کراسینگ اور تنوع صفات پیوسته را در زاده‌های یک زوج والد کاهش می‌دهد.
- (۱) I, III, V, (۲) II, III, IV, (۳) I, II, IV, (۴) I, II, III, IV, V
- ۳۵- برای وقوع رویداد نوترکیبی در میوز، کروموزوم‌های هومولوگ باید جفت شوند. کدام یک از گزینه‌های زیر در جفت شدن و تفکیک درست کروموزوم‌ها درست نیست؟
- (۱) تشکیل یک یا چند کیاسما در هر کروموزوم
 (۲) تشکیل دو یا چند کیاسما در هر بازوی کروموزوم
 (۳) تشکیل کیاسماهای انتهایی به تعداد زیاد در هر بازوی کروموزوم
 (۴) جفت شدن کروموزوم‌ها از طریق جفت شدن سانترومرها
- ۳۶- کدام گزینه نمی‌تواند نتیجه میوز افراد حامل جابه‌جاگی دو ظرفی متعادل (balance reciprocal translocation) باشد؟
- (۱) normal phenotype (۲) trisomy (۳) partial Monosomy
 (۴) partial trisomy
- ۳۷- کدام مورد در خصوص بسته‌بندی (packing) زنوم ویروس درست نیست؟
- (۱) اسید نوکلئیک در درون سر ویروس (head shell) از تراکم نسبی برخوردار است.
 (۲) تراکم اسید نوکلئیک با اندازه سر ویروس (head shell) نسبت معکوس دارد.
 (۳) کمیت طول DNA در درون سر ویروس (head shell) مستقل از سایز آن است.
 (۴) طول DNA که می‌تواند وارد ویروس شود توسط ساختمان سر ویروس (head shell) محدود می‌شود.
- ۳۸- کدام گزینه در مورد کروموزوم‌های پلی‌تن از درستی بیشتری برخوردار است؟
- (۱) دارای الگوی پافینگ (pulling) ثابت هستند.
 (۲) این کروموزوم‌های پروفازی دارای الگوی تیره و روشن (بندینگ) هستند.
 (۳) با توجه به الگوی بندینگ، این کروموزوم‌ها متافازی هستند.
 (۴) الگوی بیان مشابه کروموزوم‌های لمپ براش (lamp brush) دارند.
- ۳۹- کدام گزینه تعریف درستی از کاریوتایپ (q₁₀; q₁₀; ۲۱; ۲۱; ۴۶, XX, der(۱۴; ۲۱) را ارائه می‌دهد؟
- (۱) این قرد دارای جابه‌جاگی رابرتسونی است و از کروموزوم ۱۴ سه نسخه دارد.
 (۲) این قرد دارای جابه‌جاگی رابرتسونی است و از کروموزوم ۲۱ سه نسخه دارد.
 (۳) این فرد دارای جابه‌جاگی متقابل بین کروموزوم‌های ۱۴ و ۲۱ است.
 (۴) این فرد دارای جابه‌جاگی رابرتسونی از نوع متعادل بین کروموزوم‌های ۱۴ و ۲۱ است.

- ۴۰- تصویر زیر، مربوط به نتایج **array-CGH** است. کدام‌یک از موارد زیر در مورد فردی که آنالیز روی آن صورت گرفته، درست است؟



- (۱) این فرد دارای سه نسخه از تمام کروموزوم‌های خود است.
 (۲) این فرد دارای یک نسخه از کروموزوم شماره ۱ و دو نسخه از کروموزوم ۲۲ است.
 (۳) این فرد دارای سه نسخه از بخشی از کروموزوم ۱ و یک نسخه از بخشی از کروموزوم ۲۲ است.
 (۴) این فرد دارای دو نسخه از کروموزوم شماره ۱ و سه نسخه از کروموزوم ۲۲ است.

- ۴۱- کدام مورد تفاوت بین یک ژن ساختاری و یک ژن تنظیمی است؟

- (۱) ژن‌های ساختاری ساختارهای پیچیده‌ای دارند، ژن‌های تنظیمی ساختارهای ساده‌ای دارند.
 (۲) ژن‌های ساختاری به mRNA رونویسی می‌شوند، ژن‌های تنظیمی رونویسی نمی‌شوند.
 (۳) ژن‌های ساختاری پروتئین‌ها را رمزگذاری می‌کنند که در ساختار سلول عمل می‌کنند، ژن‌های تنظیمی واکنش‌های متابولیسمی را انجام می‌دهند.
 (۴) ژن‌های ساختاری پروتئین‌هایی را رمزگذاری می‌کنند که در متابولسم یا بیوسنتز یا ساختار سلول استفاده می‌شوند.

- ۴۲- کدام‌یک از تغییرات زیر یک جایگزینی از نوع انتقالی (**transition**) است؟

- (۱) آدنین به جای سیتوزین
 (۲) درج سه جفت نوکلئوتید در DNA

- ۴۳- در پروتئین‌های متصل شونده به DNA، آمینواسیدها چگونه با DNA برهمنکش دارند؟

- (۱) ایجاد پیوندهای کووالانسی بین بازهای DNA
 (۲) ایجاد پیوندهای کووالانسی با قندهای DNA
 (۳) ایجاد پیوندهای هیدروژنی با بازهای DNA
 (۴) ایجاد پیوندهای یونی با بازهای DNA

- ۴۴- در یک پلی ریبوزوم، پلی پپتیدها در کدام ریبوزوم‌ها بلندتر هستند؟

- (۱) آن‌هایی که در 3' mRNA قرار گرفته‌اند.
 (۲) آن‌هایی که در 5' mRNA قرار گرفته‌اند.
 (۳) آن‌هایی که در وسط mRNA قرار گرفته‌اند.
 (۴) همه پلی پپتیدها یک طول خواهند داشت.

- ۴۵- در اپرون *trp*, در غیاب تریپتوفان چه اتفاقی برای سرکوبگر *trp* می‌افتد؟
- (۱) به اپراتور متصل می‌شود و رونویسی را مهار می‌کند.
 - (۲) به ژن تنظیمی متصل می‌شود و رونویسی را مهار می‌کند.
 - (۳) نمی‌تواند به اپراتور متصل شود و رونویسی رخ می‌دهد.
 - (۴) نمی‌تواند به ژن تنظیمی متصل شود و رونویسی رخ می‌دهد.
- ۴۶- کدام دسته از RNA به درستی با عملکردش مرتبط شده است؟
- (۱) RNA کوچک هسته‌ای (snRNA): RNA را پردازش می‌کند.
 - (۲) RNA انتقالی (tRNA): به یک آمینو اسید متصل می‌شود.
 - (۳) RNA ریبوزومی (rRNA): تداخل RNA را انجام می‌دهد.
 - (۴) میکرو RNA (miRNA): اطلاعات مربوط به توالی آمینواسیدی پروتئین را حمل می‌کند.
- ۴۷- اثر سطوح بالای گلوگز بر اپرون *lac* چیست؟
- (۱) رونویسی کمی اتفاق می‌افتد.
 - (۲) رونویسی تحریک می‌شود.
 - (۳) رونویسی تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد.
 - (۴) رونویسی ممکن است بسته به سطوح لاکتوز تحریک یا مهار شود.
- ۴۸- کدام آنزیم باکتریایی پرایمرها را حذف می‌کند؟
- (۱) پریمار
 - (۲) لیگاز
 - (۳) DNA پلیمراز III
 - (۴) DNA پلیمراز I
- ۴۹- در گل یک گیاه جهش یافته در ژن‌های کلاس A و B, چه نوع ساختارهایی در حلقه‌های یک تا چهار انتظار می‌رود؟
- (۱) برچه، پرچم، پرچم، برچه
 - (۲) کاسبرگ، کاسبرگ، کاسبرگ، کاسبرگ
 - (۳) کاسبرگ، کاسبرگ، برچه، برچه
 - (۴) تفاوت‌ها در ترکیب باز دو رشته
- ۵۰- باکتری اشريشیاکلی، ترمیم جفت باز ناجور براساس رشته‌های جدید و قدیمی DNA را از هم تمیز می‌دهد.
- (۱) گروه‌های متبل در رشته قدیمی
 - (۲) آنالوگ‌های بازی در رشته جدید
 - (۳) تغییر پروتئین‌های هیستون
- ۵۱- اگر تلومر از یک ارگانیسم جهش یابد و غیر فعال شود، چه اتفاقی می‌افتد؟
- (۱) آنزیم DNA پلیمراز در تلومر متوقف خواهد شد.
 - (۲) پرایمرهای RNA برداشته نمی‌شوند.
 - (۳) کروموزم‌ها در هر نسل کوتاه می‌شوند.
 - (۴) هیچ همانندسازی در DNA اتفاق نمی‌افتد.
- ۵۲- سنجاق سرها در DNA در نتیجه وجود ابعاد می‌شوند.
- (۱) توالی‌های یکسان در رشته مقابل
 - (۲) توالی‌های مکمل در رشته مقابل
 - (۳) توالی‌های یکسان در یک رشته
 - (۴) توالی‌های معکوس و مکمل در یک رشته
- ۵۳- مفهوم صفت آستانه‌ای (*threshold trait*), در کدام گزینه به درستی تعریف شده است؟
- (۱) در یک جمعیت با فراوانی بسیار اندک دیده می‌شوند.
 - (۲) فراوانی آن‌ها با توانایی بقای فوق العاده هتروزیگوت‌ها همراه است.
 - (۳) به شکل وراثت ممتد (*continuous inheritance*) بروز می‌یابند.
 - (۴) در منحنی توزیع نرمال به شکل یک دسته مجزا دیده می‌شوند ولی تحت تأثیر محیط و ژن‌ها بروز می‌یابند.

- ۵۴- همانندسازی ناپیوسته ناشی از کدام ویژگی DNA است؟
- (۱) رشته‌های نوکلئوتیدی ناهمسو
 - (۲) گروه فسفات باردار
 - (۳) بازهای مکمل
 - (۴) قند پنج کربنه
- ۵۵- در رشته پیرو، پرایمرها کجا ساخته می‌شوند؟
- (۱) تنها در انتهای رشته نو ساخته
 - (۲) تنها در انتهای رشته نو ساخته
 - (۳) در آغاز هر قطعه اکازاکی
 - (۴) در مکان‌های متفاوت در بک قطعه اکازاکی
- ۵۶- فعالیت رزولواز در نوترکیبی چیست؟
- (۱) ساختار هالیدی را می‌شکند.
 - (۲) دو رشته‌ای را زم باز می‌کند.
 - (۳) به یک رشته DNA اجراه می‌دهد به یک مارپیچ DNA حمله کند.
 - (۴) یکی از رشته‌های DNA اصلی را طی مهاجرت شاخه جایه‌جا می‌کند.
- ۵۷- چنین برآورده است که تعداد زن‌های فعال از نظر رونویسی در انسان، در مقایسه با موجودات بسیار ساده‌تر، به طور نسبی کمتر است. علم چیست؟
- (۱) آمپلی فیکاسیون‌های بعد رونویسی زن‌هاست.
 - (۲) مدیفیکاسیون‌های بعد رونویسی زن‌هاست.
 - (۳) تأثیرات اپی زنتیکی به کمک اپیمرازهاست.
 - (۴) وجود چندین زن کاذب بهارای هر زن «واقعی» است.
- ۵۸- ظاهر زیگزاگی متمایز رشته کروماتین به خاطر کدام جزو است؟
- | | | | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Histone core (۴) | Histone H1 (۳) | Nucleosome (۲) | Linker DNA (۱) |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
- ۵۹- mRNA کدامیک از پروتئین‌های زیر طول عمر بیشتری دارد؟
- | | | | |
|-------------------|---------------|----------------|-----------------|
| blood globins (۴) | Nucleases (۳) | Polymerase (۲) | SSB protein (۱) |
|-------------------|---------------|----------------|-----------------|
- ۶۰- تولید پادتن‌های مونوکلونال، نخستین بار با کدامیک از روش‌های زیر عملی شد؟
- (۱) DNA - RNA hybridization (۱)
 - (۲) somatic cell hybridization (۲)
 - (۳) recombinant DNA technology (۳)
 - (۴) pure culture of cells producing antibodies (۴)
- ۶۱- افزاییدها (enhancers) که توالی‌های تنظیمی فرایند رونویسی هستند، کار خود را با افزایش کدامیک از اجزاء، انجام می‌دهند؟
- (۱) عوامل رونویسی عمومی
 - (۲) RNA پلیمراز در محل یک پروموتر منفرد
 - (۳) عوامل رونویسی که به پرموتر، و نه RNA پلیمراز، متصل می‌شوند.
 - (۴) RNA پلیمراز و برای قادر ساختن آنزیم به فعالیت ورای ناحیه پایان دهنده رونویسی یک زن بازهای نادر چگونه در tRNA وارد می‌شوند؟
- ۶۲- بازهای نادر در چگونه در RNA راهنمایی می‌شوند؟
- (۱) با RNA راهنمایی می‌شوند.
 - (۲) با بازهای نادر در DNA رمزگذاری می‌شوند.
 - (۳) با توالی‌هایی در اینtron‌ها رمزگذاری می‌شوند.
 - (۴) با تغییرات شیمیایی در بازهای استاندارد ایجاد می‌شوند.
- ۶۳- چه تفاوتی بین پروموتور مرکزی و پروموتور تنظیمی وجود دارد؟
- (۱) پروموتور تنظیمی بالادست‌تر است.
 - (۲) تنها پروموتور مرکزی توالی‌های مورد توافق دارد.
 - (۳) نوع مرکزی در زن‌های ساختاری و نوع تنظیمی در زن‌های تنظیمی نقش ویژه دارند.
 - (۴) عوامل رونویسی تنها به پروموتور مرکزی متصل می‌شوند و به پرتومر تنظیمی متصل نمی‌شوند.

۶۴- به کدام دلیل آنالوگ‌های بازی جهش‌زا هستند؟

(۱) ساختار DNA را می‌بیچانند.

(۲) از نظر ساختاری شبیه بازهای طبیعی هستند.

(۳) از نظر شیمیایی بازهای طبیعی را تغییر می‌دهند.

(۴) در DNA پلیمراز تغییراتی ایجاد می‌کنند که باعث عملکرد بد آن می‌شود.

۶۵- ناکفایی‌هاپلوبیلیتی (haploinsufficiency) در کدام گزینه درست تعریف شده است؟

(۱) عقیمی ناشی از تشکیل گامت‌هایی که به دنبال تقسیم میوز می‌برند.

(۲) کاهش بسیار شدید بیان زن در زن‌های وابسته جنس وقتی که فقط یک آلل جهش‌یافته نهفته می‌تواند بیان شود.

(۳) فنوتیپ جهش‌یافته در فرد ناخالص (m/M) و حصول بیان بیشتر زن، نسبت به فرد خالص نهفته (m/m) نشان می‌دهد.

(۴) وضعیت نادری از یک فنوتیپ باز که در آن فرد هتروزیگوت برای یک آلل بارز و یک آلل پوج (null) فنوتیپ غیرعادی دارد.

۶۶- کدام یک از رویدادهای زیر کندترین رویداد است؟

(۱) همتاسازی (Replication)

(۲) رونویسی (Transcription)

(۳) ترجمه (Translation)

(۴) پیرایش (Splicing)

۶۷- در یک آزمایش برای تولید یک موش (APC) از طریق تغییر ژنگان سلول‌های بنیادی جنینی هستیم. کدام یک از روش‌های زیر برای این کار مناسب است؟

(۱) antisense RNA

(۲) به کار گیری RNA ribozyme

(۳) CRISPR/cas 9

(۴) استفاده از siRNA علیه زن

۶۸- لق بودگی (wobble) یک می‌تواند با بیش از یک جفت شود.

(۱) آنتی کدون، کدون

(۲) آنتی کدون، کدون

۶۹- mRNA، گروه سه نوکلئوتیدی در DNA، کدون در

(۳) کدون، آنتی کدون

(۴) در انجام ترجمه، ایجاد پیوندهای پیتیدی بین آمینواسیدها را کاتالیز می‌کند.

(۱) یک پروتئین در زپرواحد بزرگ ریبوزوم

(۲) یک پروتئین در زپرواحد کوچک ریبوزوم

(۳) rRNA

(۴) tRNA

۷۰- کدام مورد زیر، گروهی از مولکول‌های RNA هستند که در لکه‌های پیرایشگر (splicing speckles) و اجسام کاخال (cajal) سلول‌های یوکاریوتی یافت می‌شوند؟

(۱) piwi - interaction RNA

(۲) (micro RNA) miRNA

(۳) small nuclear RNA snRNA

(۴) (small interfering RNA) siRNA

۷۱- در ترتیب توالی‌های داده شده برای بخشی از یک پلی پیتید، تغییر پدید آمده بر اثر یک جهش حروف چه نوع جهشی می‌تواند باشد؟

Normal: Val-His-Leu-Thr-Pro-Glu-Glu-Lys-Ser-Ala---

Mutant: Val-His-Leu-Thr-Pro-Val-Glu-Lys-Ser-Ala---

nonsense (۱)

missense (۲)

isoform (۳)

frameshift (۰)

- ۷۲- کدام یک از رویدادهای زیر می‌تواند ناشی از جهشی در نواحی تنظیمی یک ژن باشد؟
- در هم‌ریختن پیرایش ژن
 - بیان زیادتر یا کمتر یک ژن
 - ایجاد یک پروتئین غیرعملکردی
 - تولید یک آنزیم با فعالیت کاهش یافته
- ۷۳- تحلیل QTL به کدام مورد زیر اطلاق می‌شود؟
- شناسایی نواحی کروموزومی مربوط به یک صفت کمی
 - تعیین بخش‌هایی از ژن‌ها که سریع ترین تکامل را داشته‌اند.
 - تعیین محل‌های اتصال RNA - پلیمراز
 - ترسیم نقشه ژن‌ها در ویروس‌ها
- ۷۴- کدام گزاره‌های زیر در توصیف ژنگان سلول‌های سرطانی درست‌اند؟
- همانندسازی در سلول‌های عادی کندتر از سلول‌های سرطانی است.
 - ناهنجری‌های کروموزومی فراوانی بیشتری دارند.
 - تلومرها در سلول‌های سرطانی طولانی ترند.
 - سلول‌های سرطانی می‌توانند اجزاء DNA با منشاء بیرونی مانند ویروس‌ها را کسب کرده باشند.
- | | |
|--------------------|-----------------|
| I, III, IV (۲) | I, II, III (۱) |
| I, II, III, IV (۴) | II, III, IV (۳) |
- ۷۵- فعال بودن کدام یک از آنزیم‌های زیر می‌تواند دلیلی بر وضعیت و شرایط سرطانی بودن سلول‌های بدنی باشد؟
- ribonuclease (۲)
 - telomerase (۱)
 - phospholipase (۴)
 - ribosomes (۳)
- ۷۶- دگره پوچ (null allele) نتیجه کدام یک از اتفاقات جهش است؟
- جهش حذف (deletion)
 - جهش به دست آوردن عملکرد (gain of function)
 - جهش از دست دادن عملکرد (loss of function)
 - جهش تغییر در تعداد نسخه (copy number variation)
- ۷۷- به کدام دلیل ژنگان مخمر نان ۴۰٪ برابر ژنگان انسان بوده و تقریباً ۲/۰ برابر به آن ژن دارد؟
- ژنگان مخمر دارای ژن‌های همپوشان بسیاری است.
 - ژن‌های مخمر دارای کدون‌های کمتری نسبت به ژن‌های انسان است.
 - ژنگان مخمر حاوی DNA بین ژنی بسیار کمتری بوده و اینترون‌های آن نیز نسبت به ژنگان انسان کمتر است.
 - کروموزوم‌های مخمر دارای سانتروم و تلومرها کوتاه‌تری نسبت به کروموزوم‌های انسان می‌باشد.
- ۷۸- کدام یک از آمیزش‌های زیر بین سوبیه‌های *E.coli* منجر به فراوانی بالای انتقال ژن‌های گرموزومی می‌شود؟
- | | | | |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Hfr x F ⁻ (۴) | Hfr x Hfr ⁻ (۳) | F ⁻ x F ⁺ (۲) | F ⁺ x F ⁺ (۱) |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
- ۷۹- کدام جمله تعریف درستی از homeobox را بیان می‌کند؟
- توالی پیتیدی مرکب از ۶۰ آمینو اسید که در روش خاموش کردن ژن‌ها نقش ایفا می‌کند.
 - توالی نوکلئوتیدی خاص موجود در برخی از ژن‌های دخیل در نمو جنبی
 - ژن‌های حفظ شده در تمام مهره‌داران که در تکوین ستون پشتی آن‌ها نقش دارند.
 - گروهی از ژن‌ها که در طول تکوین جنبی پلازیتی آن را تعیین می‌کنند.

- ۸۰- کدام‌یک از دستورهای ژنتیکی زیر را با کریسپر (CRISPR) می‌توان انجام داد؟
- I. Knockin ژنی
 - II. Knockout ژنی
 - III. ویرایش ژنی
 - IV. ایجاد جهش نقطه‌ای در ژن
 - V. خاموش‌سازی ژنی
 - VI. فعال‌سازی ژنی
 - VII. درمان ژنی
 - VIII. تغییرات ابی‌ژنتیک
- III, II, I, (۲)
VIII, VII, VI, IV, (۴)
- ۸۱- برای تولید انسولین انسانی به روش همسانه‌سازی (*E.coli*) در باکتری *E.coli* از کدام‌یک از موارد زیر می‌توان استفاده کرد؟
- (۱) DNA ژنگانی
 - (۲) یک کپی از cDNA ژن
 - (۳) spliced mRNA
 - (۴) mRNA precursor
-lac Zα (۱)
VIII, I, (۳)
- ۸۲- در حضور آلوکتوز، سرکوبگر *lac*
- (۱) به پرموتور متصل می‌شود.
 - (۲) به اپراتور متصل می‌شود.
 - (۳) به ژن تنظیمی متصل می‌شود.
 - (۴) نمی‌تواند به اپراتور متصل شود.
- ۸۳- در بررسی مکانسیم اثر یک داروی ضد سرطان معلوم شده که دارو یک غیرفعال گننده بسیار قوی فعالیت مدبفیکاسیون کروماتین است. این مدبفیکاسیون موجب افزایش بیان دسته ژنی انکوژن‌هاست. کدام فعالیت تغییردهنده کروماتین یا تأثیر این دارو به احتمال زیاد تحریک می‌شود؟
- (۱) اتصال هیستون H1 به نوکلئوزوم
 - (۲) استیلاسیون هیستون‌های مرکزی
 - (۳) داستیلاسیون هیستون‌های مرکزی DNA
 - (۴) دمتیلاسیون بازهای سیتوزین در DNA
- ۸۴- یک تکه DNA به طول ۷۶۸ زوج بازی با برآندگی یکنواخت زوج‌های نوکلئوتیدی را در مجاورت ↓
- ↑
- از برش تکه DNA فوق توسط این آنزیم انتظار می‌رود؟
- (۱) ۲ (۲)
 - (۲) ۳ (۴)
 - (۳) ۴ (۴)
 - (۴) غیرقابل پیش‌بینی است.

- ۸۵ - با توجه به autoradiogram of gel داده شده در شکل زیر که نتیجه توالی یابی به روش Maxam – Gilbert است، کدام گزینه توالی نوکلئوتیدی یک قطعه DNA تک رشته‌ای است؟

پورین‌ها	پیرimidین‌ها
— —	— —
—	—
—	—
— —	— —
— —	— —
— —	— —

۱) ۵'-A-G-G-C-T-T-A-G-C-۳'

۲) ۵'-C-G-A-T-T-C-G-G-A-۳'

۳) ۵'-G-A-A-T-C-C-G-A-T-۳'

۴) ۵'-T-A-G-C-C-T-A-A-G-۳'

- ۸۶ - کدام یک از ناقلين ژنی زیر توان ورود به زنگان (genome) میزبان را ندارند؟

pBR322 (۲)

(۱) فاز λ

adeno- associated virus (۴)

(۳) retrovirus

- ۸۷ - cosmid چیست؟

(۱) از جمله پلاسمیدهای حاصل و ساده‌ای است که در مهندسی ژنتیک به کار می‌رود.

(۲) ناقل کلون‌سازی ژن است که برای حمل قطعات DNA تا ۱۵ کیلوباز به کار می‌رود.

(۳) ناقل کلون‌سازی ژن است که برای حمل قطعات DNA تا ۳۵ کیلوباز به کار می‌رود.

(۴) ناقل کلون‌سازی ژن است که برای حمل قطعات DNA بین ۳۷ تا ۵۲ کیلوباز به کار می‌رود.

- ۸۸ - مطالعات ژن گزارشگر (reporter gene) در زیست‌شناسی مولکولی برای جستجوی چه فرایندی انجام می‌شود؟

(۱) آزمایشات جایابی ژن‌ها

(۲) بررسی فعالیت رونویسی یک ژن خاص

(۳) برهمکنش پروتئین‌ها و RNA‌های تنظیمی

(۴) کدام آنزیم باکتریایی، توالی DNA ویروس (پلاسمید) مهاجم را بوبده و آن را تخریب می‌کند؟

ribonuclease (۴)

DNAase (۳)

dicer (۲)

Cas9 (۱)

- ۹۰ - موجودات ترازنیک (transgenic) چگونه تولید می‌شوند؟

(۱) با جهش‌های ژنتیکی

(۲) هیبریدسازی کروموزوم‌ها

(۳) افزودن، حذف یا مدیفیکاسیون ژن‌ها

(۴) ترانسفورماسیون ژنتیکی توسط باکتری‌ها

یک ژنتیکدان علاقمند به مطالعه عملکرد سیستم ایمنی، جهش‌های تصادفی در ژن‌های خاصی در موش ایجاد

می‌کند و سپس مشخص می‌کند در کدام موش جهش یافته عملکرد سیستم ایمنی مختل شده است. این فرایند

نمونه‌ای است از:

(۱) ژنتیک معکوس (reverse genetics)

(۲) ژنتیک مستقیم (forward genetics)

(۳) نه ژنتیک مستقیم و نه ژنتیک معکوس

(۴) ژنتیک مستقیم و ژنتیک معکوس

-۹۲- کدام جمله در مورد **pyrosequencing** درست است؟

۱) توکلتوتیدهای مصرفی به شکل دی‌فسفاته هستند.

۲) حداقل اندازه قطعه تعیین توالی 15^{00} نوکلوتید است.



۳) در این روش، نیازی به ژل‌ریزی برای مشاهده نتایج وجود ندارد.

۴) نوکلوتیدهای نشان‌دار در صورت ورود به زنجیره در حال سنتز شناسایی می‌شوند.

-۹۳- در روش **isoelectric focusing** جداسازی پروتئین‌ها بر پایه چه گرادیانی انجام می‌گیرد؟

۱) سوکروز ۲) دما ۳) NaCl ۴) pH

-۹۴- یک قطعه DNA به اندازه 8kbs که با ^{32}P در انتهای $5'$ نشان‌گذاری شده را توسط EcoRI و Bgl II و مخلوط هر دو آنزیم جداگذاشت (Digested). اندازه تکه‌های حاصل از برش بر حسب Kbs را در هر مورد با مشخص کردن تکه‌های نشان‌دار با ^{32}P به کمک ستاره (*) روی ژل آگاروز در طرح داده شده است. کدام **Restriction Map** در چهار گزینه داده شده با این نتیجه همخوانی دارد؟



-۹۵- کدام مورد زیر، ترتیب صحیح در غربالگری جهشی است؟

۱) همسانه‌سازی موقعیتی، جهش‌زایی، شناسایی جهش‌یافته‌ها، بررسی اساس ژنتیکی

۲) جهش‌زایی، شناسایی جهش‌یافته‌ها، بررسی اساس ژنتیکی، همسانه‌سازی موقعیتی

۳) جهش‌زایی، همسانه‌سازی موقعیتی، شناسایی جهش‌یافته‌ها، بررسی اساس ژنتیکی

۴) شناسایی جهش‌یافته‌ها، همسانه‌سازی موقعیتی، جهش‌زایی، بررسی اساس ژنتیکی

-۹۶- کانتیگ (contig) چیست؟

- ۱) یک قطعه DNA کوچک که در توالی یابی استفاده می‌شود.
- ۲) مجموعه‌ای از قطعات که از هضم با آنزیم‌های محدود گذشته ایجاد می‌شود.
- ۳) مجموعه‌ای از شاخص‌های مولکولی که در نقشه‌برداری ژنی از آن استفاده می‌شود.
- ۴) مجموعه‌ای از قطعات همپوشان که قطعه‌ای پیوسته از DNA ایجاد می‌کند.

-۹۷- جزء اصلی کمپلکس کریپسر (CRISPR)، کدامیک از عناصر زیر است؟

- | | | | |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| iRNA (۴) | SiRNA (۳) | SnRNA (۲) | SgRNA (۱) |
|----------|-----------|-----------|-----------|

-۹۸- در بحث **genome annotation**، کدامیک از گزینه‌های زیر برای پیشگویی توالی‌های ژنی در پروکاریوت‌ها مورد استفاده فرار می‌گیرد؟

- ۱) پیدا کردن insulator در میان ژن‌ها
- ۲) جستجوی مناطق CpG islands در بالادست ژن‌ها
- ۳) پیدا کردن ORF‌های احتمالی از طریق کدون شروع و کدون پایان ژن
- ۴) پیدا کردن توالی‌های مرز اگزون و اینترون

-۹۹- کدام گزینه از مزایای وکتورهای YAC حلقوی نسبت به YAC خطی نیست؟

- ۱) YAC حلقوی نسبت به YAC خطی مقاومت بالاتری به shearing force دارد.
- ۲) امکان ورود قطعات با طول بلندتر به YAC حلقوی وجود دارد.
- ۳) YAC حلقوی نسبت به YAC خطی پایداری بیشتری دارد.
- ۴) می‌توان YAC حلقوی را وارد میزبان پروکاریوتی کرد.

-۱۰۰- کدامیک از موارد زیر برای تهیه (Expressed sequenced tags) ESTs در بانک‌های اطلاعاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

- ۱) کتابخانه cDNA از بافت‌های مختلف یک گونه زیستی
- ۲) کتابخانه DNA از بافت‌های مختلف یک گونه زیستی
- ۳) مجموعه اگزوم (exome) از یک ژنگان
- ۴) مجموعه توالی‌های sequenced arrayed sites ژنگان یک گونه زیستی