

توجه: استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است.

۱/۵

با استفاده از واژه های درون کادر ، عبارت های زیر را کامل کنید.

کاهش - باز-الماس- اسید- ضد عفوی - گرافیت - CO - افزایش - حلال چسب

(آ) در ساخت متنه ها و ابزار برش شیشه از استفاده می شود.

(ب) سلول های سوختی افزون بر کارایی بیشتر ، رد پای کربن دی اکسید را می دهند.

(پ) محلول آبی گوگرد تری اکسید (SO_3) یک و محلول آبی باریم اکسید (BaO) یک آرنیوس به شمار می رود.

(ت) از اتیل استات به عنوان استفاده می شود و اتانول برای به کار می رود.

۱/۷۵

درستی یا نادرستی هر یک از عبارت های زیر را مشخص کنید. شکل درست عبارت های نادرست را بنویسید.

(آ) نافلزها اغلب کاهنده هستند.

(ب) ذرات سازنده کلوئیدها توده های مولکولی یا یونی است.

(پ) سختی کربن دی اکسید جامد (s) CO_2 از سیلیس (s) SiO_2 بیشتر است.

(ت) جهت حرکت الکترون ها در مدار بیرونی یک سلول گالوانی ، همواره از کاتد به آند است.

۰/۷۵

با توجه به نقشه پتانسیل الکتروستاتیکی زیر پاسخ دهید.

(آ) این مولکول قطبی است یا ناقطبی؟ چرا؟

(ب) کدام رنگ تراکم بیشتر بار الکتریکی را در این نقشه نشان می دهد؟

۱/۲۵

با توجه به جدول زیر پاسخ دهید.

(آ) چگالی بار یون Na^+ بیشتر است یا یون K^+ ؟ چرا؟

(ب) آنتالپی فروپاشی شبکه کلسیم فلوراید (CaF_2) بیشتر


است یا کلسیم اکسید (CaO)؟ چرا؟

(پ) با توجه به داده های جدول فرمول شیمیایی ترکیبی را بنویسید که دارای گمتوفین نقطه ذوب است.


"ادامه سوالات در صفحه دوم "

با سمه تعالی


سوالات امتحان: شیمی ۳	رشته: ریاضی- فیزیک و علوم تجربی	ساعت شروع: ۱۰: صبح	تعداد صفحه: ۴
نام و نام خانوادگی:	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	تاریخ امتحان: ۱۴۰۰/۱۰/۱۸	مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور درنوبت دی ماه سال ۱۴۰۰	مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی http://aee.medu.ir		

ردیف	سوالات (پاسخ نامه دارد)	نمره												
۵	غلظت یون هیدروکسید در یک نوع صابون برابر 10^{-8} مول بر لیتر است. اگر pH پوست دست انسان در حدود ۵/۶ تا ۶/۲ باشد، با محاسبه نشان دهید آیا این صابون برای شستن دست ها مناسب است؟	۱/۲۵												
۶	بخشی از یک ورقه آهنی با لایه نازکی از فلز روی پوشش داده شده است. به پرسش های زیر پاسخ دهید. آ) نام این نوع آهن چیست؟ ب) نیم واکنش های اکسایش و کاهش را هنگام ایجاد خراش در سطح این نوع ورق بنویسید. ($E^\circ_{\text{رون}} > E^\circ_{\text{آهن}}$)	۱/۲۵												
۷	با توجه به جدول زیر که ثابت یونش چند باز در دمای ۲۵°C نشان داده شده است به پرسش های زیر پاسخ دهید. <table border="1"><thead><tr><th>K_b</th><th>فرمول شیمیایی</th><th>نام اسید</th></tr></thead><tbody><tr><td>$5/9 \times 10^{-4}$</td><td>$\text{NH}(\text{CH}_3)_2(aq)$</td><td>دی متیل آمین</td></tr><tr><td>$1/8 \times 10^{-5}$</td><td>$\text{NH}_3(aq)$</td><td>آمونیاک</td></tr><tr><td>بسیار بزرگ</td><td>$\text{NaOH}(aq)$</td><td>سدیم هیدروکسید</td></tr></tbody></table> آ) کدام یک باز قوی تری است؟ چرا؟ ب) بدون محاسبه بیان کنید که pH کدام محلول کمتر است؟ دلیل بنویسید. پ) در دمای یکسان، رسانایی الکتریکی محلول ۱ مولار سدیم هیدروکسید کمتر است یا محلول ۱ مولار دی متیل آمین؟	K_b	فرمول شیمیایی	نام اسید	$5/9 \times 10^{-4}$	$\text{NH}(\text{CH}_3)_2(aq)$	دی متیل آمین	$1/8 \times 10^{-5}$	$\text{NH}_3(aq)$	آمونیاک	بسیار بزرگ	$\text{NaOH}(aq)$	سدیم هیدروکسید	۱/۲۵
K_b	فرمول شیمیایی	نام اسید												
$5/9 \times 10^{-4}$	$\text{NH}(\text{CH}_3)_2(aq)$	دی متیل آمین												
$1/8 \times 10^{-5}$	$\text{NH}_3(aq)$	آمونیاک												
بسیار بزرگ	$\text{NaOH}(aq)$	سدیم هیدروکسید												
۸	نمودار زیر مربوط به واکنش حذف آلاینده CO در اگزوز خودرو در غیاب مبدل کاتالیستی است، با توجه به آن پاسخ دهید.  آ) انرژی فعال سازی و آنتالپی این واکنش چقدر است؟ ب) این واکنش گرماده است یا گرمایشی؟ چرا؟ پ) با استفاده از مبدل کاتالیستی، انرژی فعال سازی و آنتالپی این واکنش چه تغییری می کند؟	۱/۵												
۹	دلیل هریک از عبارت های زیر را بنویسید. آ) اسیدهای چرب نمی توانند به خوبی در آب حل شوند. ب) انرژی فعالسازی واکنش تبدیل پارازایلن به ترفتالیک اسید زیاد است. پ) شبکه بلوری فلزها، بر اثر ضربه چکش نمی شکند. ت) ترکیبات یونی فقط در حالت مذاب و محلول رسانایی الکتریکی دارند.	۲												
	"ادامه سوالات در صفحه سوم"													

۱



(۱)



(۲)

در مورد دو محلول اسیدی زیر به پرسش ها پاسخ دهید.

(آ) در صد یونش محلول (۲) را محاسبه کنید.

(ب) در شرایط یکسان سرعت واکنش فلز منیزیم با یک لیتر محلول

۱ مولار کدام اسید (۱) یا (۲) بیشتر است؟ چرا؟

۱/۵

با توجه به جدول زیر که غلظت تعادلی مواد شرکت کننده واکنش $\text{PCl}_5(\text{g}) \rightleftharpoons \text{PCl}_۳(\text{g}) + \text{Cl}_۲(\text{g})$ را در دمای ۲۰۰°C نشان می دهد، پاسخ دهید.

PCl_5	$\text{PCl}_۳$	$\text{Cl}_۲$	ماده
۴×10^{-۲}	۱×10^{-۴}	۲×10^{-۶}	غلظت تعادلی

۱۱


(آ) مقدار ثابت تعادل واکنش (K) را در این دما حساب کنید.

(ب) با خارج کردن مقداری از گاز کلر، سامانه تعادلی در چه جهتی جابجا می شود؟ چرا؟


(پ) با افزایش فشار پیش بینی کنید تعادل در کدام جهت جابجا می شود؟ چرا؟

۱/۲۵


با توجه به فرمول ساختاری ترکیب های زیر، به پرسش ها پاسخ دهید.



(۱)



(۲)



(۳)

(آ) عدد اکسایشن اتم های کربن های ستاره دار در ترکیب های شماره (۳) و (۱) را تعیین کنید.

(ب) ترکیب (۲) پاک کننده صابونی است یا غیرصابونی؟

(پ) کدام ترکیب (۱) یا (۲) در آب سخت بیشتر کف می کند؟ چرا؟


۱

اگر غلظت تعادلی اسید تک پروتون دار (HA) برابر ۰/۰۱ مولار و ثابت تعادل آن $۹ \times 10^{-۵} / ۴$ باشد غلظت یون هیدرونیوم را در این محلول بدست آورید.

۱۳

۱

با توجه به شکل زیر که مربوط به برقکافت سدیم کلرید مذاب است به پرسش ها پاسخ دهید.



۱۴





(آ) نوع این سلول گالوانی است یا الکتروولیتی؟ چرا؟

(ب) علت افزودن مقداری کلسیم کلرید به سدیم کلرید در این فرایند چیست؟

(پ) تعیین کنید در آند این سلول چه ماده ای تولید می شود؟

۱/۷۵

با توجه به نیم واکنش های زیر به پرسش ها پاسخ دهید.



(آ) چرا خوردگی آهن در محیط اسیدی به میزان بیشتری رخ می دهد؟

(ب) چرا با گذشت زمان فلز طلا در هوای مرطوب همچنان درخشان باقی می ماند؟

(پ) نیروی الکتروموتوری (emf) سلولی که در آن واکنش زیر رخ می دهد را محاسبه نمایید.



۲۰ جمع نمره

موفق باشید.

۱۵

۱ H ۱/۰۰۸	۶ C ۱۲/۰۱	۲ He ۴/۰۰۳
۳ Li ۶/۹۴۱	۴ Be ۹/۰۱۲	۵ B ۱۰/۸۱
۱۱ Na ۲۲/۹۹	۱۲ Mg ۲۴/۳۱	۶ C ۱۲/۰۱
۱۹ K ۳۹/۱۰	۲۰ Ca ۴۰/۰۸	۷ N ۱۴/۰۱
۲۱ Sc ۴۴/۹۶	۲۲ Ti ۴۷/۸۷	۸ O ۱۶/۰۰
۲۳ V ۵۰/۹۴	۲۴ Cr ۵۲/۰۰	۹ F ۱۹/۰۰
۲۵ Mn ۵۴/۹۴	۲۶ Fe ۵۵/۸۵	۱۰ Ne ۲۰/۱۸
۲۷ Co ۵۸/۹۲	۲۸ Ni ۵۸/۶۹	۱۳ Al ۲۶/۹۸
۲۹ Cu ۶۳/۵۵	۳۰ Zn ۶۵/۳۹	۱۴ Si ۲۸/۰۹
۳۱ Ga ۶۹/۷۲	۳۲ Ge ۷۲/۶۴	۱۵ P ۳۰/۹۷
۳۳ As ۷۴/۹۲	۳۴ Se ۷۸/۹۶	۱۶ S ۳۲/۰۷
۳۵ Br ۷۹/۹۰	۳۶ Kr ۸۳/۸۰	۱۷ Cl ۳۵/۴۵

راهنمای جدول تناوبی عنصرها
عدد اتمی
جرم اتمی میانگین

راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس: شیمی ۳	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس: ریاضی و فیزیک - علوم تجربی	تعداد صفحه: ۳
ساعت شروع: ۱۰: صبح	تاریخ امتحان: ۱۴۰۰/۱۰/۱۸		
مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی http://aee.medu.ir	دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسرکشور در نوبت دی ماه سال ۱۴۰۰		
نمره	راهنمای تصحیح		ردیف
۱/۵	(پ) اسید(۰/۲۵) - باز(۰/۲۵) (ص ۱۶)	ب) کاهش (۰/۲۵) (ص ۵۰) ت) حلال چسب(۰/۲۵) - ضد عفونی (۰/۲۵) (ص ۱۱۲)	۱ (آ) الماس(۰/۲۵) (ص ۷۰)
۱/۷۵	(آ) نادرست (۰/۲۵) نافلزها اغلب اکسنده هستند. (ب) درست (۰/۲۵) (ص ۷) (پ) نادرست (۰/۲۵) سختی کربن دی اکسید جامد (s) CO ₂ . از سیلیسیس (s) SiO ₂ کمتر است. (۰/۲۵) ص ۶۹ (ت) نادرست (۰/۲۵) جهت حرکت الکترون ها در مدار بیرونی یک سلول گالوانی، همواره از آند به کاتد است. (۰/۲۵) ص ۴۵		۲
۰/۵ ۰/۲۵	(آ) ناقطبی (۰/۲۵) زیرا بار الکتریکی در پیرامون اتم های مرکزی توزیع متقارن دارد. (ب) سرخ (۰/۲۵) ص ۷۴		۳
۰/۵ ۰/۵ ۰/۲۵	(آ) K ⁺ < Na ⁺ نسبت به K ⁺ کمتر است. (۰/۲۵) (ب) CaO (۰/۲۵) زیرا بار الکتریکی آنیون آن بیشتر است. (پ) KCl (۰/۲۵) ص ۷۸ تا ۷۹		۴
۱/۲۵	$\left[\text{H}^+ \right] \left[\text{OH}^- \right] = 10^{-14} \Rightarrow \left[\text{H}^+ \right] = \frac{10^{-14}}{10^{-8}} = 10^{-6} \text{ mol.L}^{-1}$ $\text{pH} = -\log \left[\text{H}^+ \right] = -\log 10^{-6} = +6$	بله مناسب است. (۰/۲۵) ص ۲۷ تا ۳۰	۵
۰/۲۵ ۱	(آ) آهن گالوانیزه یا آهن سفید (۰/۲۵) (ب) نیم واکنش اکسایش: Zn(s) → Zn ²⁺ (aq) + 2e ⁻ نیم واکنش کاهش: 2 H ₂ O(l) + O ₂ (g) + 4e ⁻ → 4 OH ⁻ (aq) ص ۵۹		۶
۰/۵ ۰/۵ ۰/۲۵	(آ) سدیم هیدروکسید (۰/۲۵) چون ثابت یونش بازی بزرگتری دارد. (ب) آمونیاک (۰/۲۵) چون باز ضعیف تری است. (پ) دی متیل آمین (۰/۲۵) ص ۳۶		۷
	"ادامه راهنمای تصحیح در صفحه دوم"		

راهنمای تصویب امتحان نهایی درس: شیمی ۳	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	راهنمای تصویب امتحان نهایی درس: شیمی ۳
تعداد صفحه: ۳	رشته: ریاضی و فیزیک - علوم تجربی	ساعت شروع: ۱۰: صبح
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسرکشور در نوبت دی ماه سال ۱۴۰۰	تاریخ امتحان: ۱۴۰۰ / ۱۸	مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی http://aee.medu.ir
نمره	راهنمای تصویب	ردیف
۰/۵	(آ) انرژی فعال سازی ۳۳۴ کیلو ژول (۰/۲۵) و آنتالپی واکنش برابر ۵۶۶ کیلو ژول (۰/۲۵)	۸
۰/۵	(ب) گرماده (۰/۲۵) زیرا سطح انرژی فراورده ها پایین تر از واکنش دهنده ها است. (۰/۲۵)	
۰/۵	(پ) انرژی فعال سازی کاهش می یابد (۰/۲۵) اما آنتالپی واکنش تغییر نمی کند. (۰/۲۵)	
۰/۵	(آ) در اسیدهای چرب بخش ناقطبی بر بخش قطبی غلبه می کند (۰/۲۵) پس آب که حلال قطبی است نمی تواند اسید چرب ناقطبی را در خود حل کند. (۰/۲۵) ص ۶	۹
۰/۵	(ب) چون برای این واکنش افزون بر اکسنده (۰/۲۵) به گرما (۰/۲۵) نیاز است. ص ۱۱۵	
۰/۵	(پ) هنگامی که ضربه ای به فلز وارد می شود لایه هایی از کاتیون ها در شبکه جا به جا می شود (۰/۲۵) اما دریای الکترونی جاذبه میان لایه ها را حفظ می کند. (۰/۲۵) ص ۸۲	
۰/۵	(ت) در حالت جامد یون ها حرکت انتقالی ندارند و جا به جا نمی شوند. اما در حالت مذاب یا محلول در آب به دلیل جا به جایی یون ها به سوی قطب های ناهمنام رسانایی انجام می شود. (۰/۵) ص ۸۷	
۰/۵	(آ) شمار مولکول های یونیده شده $\times 100 = \frac{1}{4} \times 100 = \% 25$ $= \frac{\text{درصد یونش}}{\text{شمار کل مولکول های حل شده}}$ (۰/۲۵)	۱۰
۰/۵	(ب) محلول (۰/۰/۲۵) چون اسید قوی تر است. (۰/۰/۲۵) ص ۱۸	
۰/۵	$K = \frac{[\text{Cl}_2][\text{PCl}_5]}{[\text{PCl}_6]} \Rightarrow K = \frac{(2 \times 10^{-6})(1 \times 10^{-4})}{(4 \times 10^{-2})} = 5 \times 10^{-9}$ (۰/۰/۲۵)	۱۱
۰/۵	(ب) راست (۰/۰/۲۵) زیرا گاز کلر خارج شده را تولید کند. (۰/۰/۲۵)	
۰/۵	(پ) چپ (۰/۰/۲۵) با افزایش فشار واکنش در جهت شمار مول های گازی کمتر پیش می رود. (۰/۰/۲۵)	
۰/۵	(آ) ترکیب (۱) : $\underline{-1} : \underline{-3}$ (۰/۰/۲۵) ص ۱۲۱	۱۲
۰/۲۵	(ب) صابونی (۰/۰/۲۵)	
۰/۵	(پ) ترکیب (۱) چون پاک کننده های غیر صابونی با یون های موجود در آب سخت رسوب نمی دهند. (۰/۰/۲۵) ص ۱۱	
۱	$K = \frac{[\text{H}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]} \rightarrow [\text{H}^+] = [\text{A}^-] \rightarrow 4 / 9 \times 10^{-5} = \frac{[\text{H}^+]^2}{+ / 1} \rightarrow [\text{H}^+]^2 = 49 \times 10^{-8} \rightarrow [\text{H}^+] = 7 \times 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$ (۰/۰/۲۵) ص ۲۲	۱۳
	"ادامه راهنمای تصویب در صفحه سوم"	

راهنمای تصویح امتحان نهایی درس:شیمی ۳	رشته: ریاضی و فیزیک - علوم تجربی	تعداد صفحه: ۳
پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	تاریخ امتحان: ۱۴۰۰/۱۰/۱۸	ساعت شروع: ۱۰: صبح
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسرکشور در نوبت دی ماه سال ۱۴۰۰	مركز سنجش و پایش کیفیت آموزشی http://aee.medu.ir	
ردیف	راهنمای تصویح	نمره
۱۴	آ) الکتروولیتی (۰/۲۵) - زیرا برای انجام بر قکافت نیاز به استفاده از باطری داریم. (چون این واکنش به صورت طبیعی انجام نمی شود.) (۰/۲۵)	۰/۵
ب) پایین آوردن نقطه ذوب (۰/۲۵)		۰/۲۵
پ) گاز کلر (۰/۲۵) ص ۵۵		۰/۲۵
۱۵	آ) با توجه به این که E° برای کاهش اکسیژن در محیط اسیدی بیشتر از محیط خنثی (آبی) است (۰/۲۵) یعنی در محیط اسیدی، O_2 اکسندره تر است بنابراین قدرت خورندگی آن افزایش می یابد. (۰/۲۵)	۰/۵
ب) از آنجا که E° طلا از E° اکسیژن مثبت تر (بیشتر) است (۰/۲۵) در مقابل طلا، اکسیژن کاهنده تر است و طلا دچار اکسایش نخواهد شد. (۰/۲۵)		۰/۵
	$\underline{\underline{emf = E_c^\circ - E_a^\circ}} \rightarrow \underline{\underline{E^\circ = ۱/۵ - (-۰/۴۴)}} = \underline{\underline{+۱/۹۴ V}}$	۰/۷۵
	ص ۵۷	
همکار محترم: لطفا در صورت مشاهده پاسخ های صحیح و مشابه کتاب درسی (به جز به کار بردن تناسب در حل مسائل عددی) نمره منظور فرمایید.	جمع نمره	۲۰